

糞便檢查注意事項

一般糞便檢查

1. 採集前三天必須禁食紅肉類、含動物血之食品(鴨血、豬血)、內臟、維生素C錠劑、鐵劑、非固醇類的退燒鎮痛藥物 (NSAID, 如Aspirin、Cataflam、Ponstan...) 或含過氧化酶活性的蔬果類例如：香蕉、葡萄、梨子、李子、紅或白蘿蔔、山葵(哇沙米)。
2. 糞便可解於乾淨垃圾袋、蹲式馬桶或便盆，請盡量勿接觸報紙油墨及衛生紙棉絮，若糞便掉於水中切勿由馬桶撈起，水便或稀便應使用乾淨容器承接。
3. 糞便收集：轉開S-Y塑膠採便盒螺旋蓋子，勿強拉耙頭，用採便棒前端耙齒挖取約1粒花生米粒大小之糞便(量過多或過少無法檢測)。採取顏色可疑(紅色或黑色)糞便或取有意義部分如膿、血、黏液進行採檢；如使用尿布請勿挖取底部接近尿布之糞便，糞便檢體置入容器後鎖緊檢查瓶。
4. 採集糞便後儘速送至收檢櫃檯；無法立即送檢時，最好置於夾鏈袋內存放於4°C冰箱，隔日儘速送檢。女性生理期後2~3天再採檢。
5. 收檢時間： 星期一至星期五 7：30 ~ 22:00 星期六 7：30 ~ 13:00。



糞便寄生蟲檢查

1. 不需禁食
2. 糞便可解於乾淨垃圾袋、蹲式馬桶或便盆。若糞便掉於水中切勿由馬桶撈起，水便或稀便應使用乾淨容器(如便盆)承接，採便量約花生米粒大小。
3. 收集到糞便後請儘速送至收檢櫃檯。
4. 收檢時間： 星期一至星期五 7：30 ~ 22:00 星期六 7：30 ~ 13:00。



糞便細菌培養檢查

1. 不需禁食
2. 糞便可解於乾淨垃圾袋、蹲式馬桶或便盆，取有意義部分如膿、血、黏液部分。
3. 以Buffer glycerol saline (BGS)糞便培養瓶內的勺子挖取花生米粒大小的糞便。
4. 請將蓋子拴緊避免瓶內糞便與固定液外漏。
5. 請於4小時內送檢。
6. 收檢時間： 星期一至星期五 7：30 ~ 22:00 星期六 7：30 ~ 13:00。

